




INTOXICATION AUX SÉDATIFS PRÉSENTS DANS L'OFFRE DE DROGUES ILLICITES




Les personnes qui consomment des opioïdes de rue ont probablement été exposées à des benzodiazépines et à des médicaments qui leur sont apparentés comme l'étizolam ou à des tranquillisants comme la xylazine. Ces substances ont été détectées dans l'offre de drogues illicites au Manitoba, surtout en combinaison avec des opioïdes, et vous pouvez difficilement savoir si les drogues que vous consommez en contiennent. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez : [Rapport sur les drogues analysées – Service d'analyse des drogues](#) | [Infobase sur la santé publique – Agence de la santé publique du Canada](#) [Alertes de drogues – Street Connections](#)



La naloxone peut temporairement inverser les effets des opioïdes, mais elle est inefficace contre des sédatifs comme les benzodiazépines, l'étizolam ou la xylazine. Les sédatifs et les opioïdes ont des effets semblables. Les cas de surdose et d'intoxication, bien qu'ils puissent aussi se ressembler, sont fort complexes et requièrent une attention médicale. L'administration de naloxone peut renverser les effets d'une surdose d'opioïdes et permettre à une personne de respirer à nouveau, mais celle-ci peut rester inconsciente en raison des sédatifs.



Chez une personne tolérante aux opioïdes, une trop grande quantité de naloxone peut provoquer un sevrage (vomissements, transpiration, douleurs intenses) et aggraver la situation. Les trousseaux de naloxone sont des outils de soutien des soins à utiliser avant l'arrivée des services médicaux d'urgence. **Toutefois, il est d'une importance capitale de composer le 911 en cas de surdose même si vous disposez de naloxone.** Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez : [À propos de la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose – Canada.ca.](#)



La dépendance et le sevrage aux benzodiazépines ou à l'étizolam peuvent survenir après une utilisation de quelques semaines seulement. L'exposition croissante aux benzodiazépines présentes dans l'offre de drogues illicites met de nombreuses personnes à risque de symptômes de sevrage aux sédatifs – ce qui inclut l'agitation, l'insomnie et un dérèglement des fonctions corporelles telles que le rythme cardiaque, la tension artérielle, la température, la fonction urinaire – qui peuvent être difficiles à distinguer des symptômes de sevrage aux opioïdes ou d'intoxication aux stimulants.



RESSOURCES PRÉPARÉES PAR BC TOWARD THE HEART (EN ANGLAIS SEULEMENT) SUR L'INTOXICATION AUX SÉDATIFS PRÉSENTS DANS L'OFFRE DE DROGUES ILLICITES

[Do I Keep Giving Naloxone](#)
[Responding to an Opioid Overdose with Benzos or Etizolam](#)
[Withdrawal from Benzodiazepines in BC's Illicit Drug Supply](#)
[Benzodiazepines found in Opioids in British Columbia](#)
[Xylazine](#)



PRÉPARER ET PRENDRE SOIN